

<b>DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA</b>
-----------------------------------

<b>PREPARO DE EXAME</b>
-------------------------

<b>COLONOSCOPIA – PERÍODO DA TARDE</b>
--

**PARA QUE O EXAME SEJA REALIZADO O PACIENTE DEVE:**

- Seguir rigorosamente os preparos de antevéspera, véspera e dia do exame.

**MEDICAMENTOS:**

- 4 cápsulas de BISACODIL;
- 100g de MANITOL (Farmácia de Manipulação).

**ALIMENTOS PROIBIDOS 2 DIAS ANTES DO EXAME:**

- Leite e derivados;
- Café;
- Coca-Cola;
- Chá e Sucos de cor escura (Exemplo: Chá Preto, Suco de Uva);
- Sementes;
- Verduras (Exemplo: Alface, Acelga, Almeirão, Couve, Rúcula, Repolho);

**ANTIVÉSPERA DE EXAME**

- **Café da manhã:** Chá de cor clara adoçado com biscoito de Água e Sal.
- **Almoço e Jantar:** Comida Pastosa – Arroz ou Macarrão cozido com sal e óleo, legumes sem casca, sucos de cor clara (Coado).
- **Ao longo do dia o paciente poderá ingerir:** Maçã e Pera sem casca, Gelatina (Menos a de cor Vermelha), Água e Sucos de cor clara (Coado) à vontade.

**VÉSPERA DO EXAME:**

- **Café da manhã:** Chá de cor clara adoçado com biscoito de Água e Sal.
- **Almoço e Jantar:** Sopa batida e coada (Caldo), Suco de cor clara (Coado).
- **Ao longo do dia o paciente poderá ingerir:** Gelatina (Menos a de cor Vermelha), Sucos de cor clara (Coado), Maçã e Pera sem casca.
- **23:00 horas:** Tomar 4 Cápsulas de BISACODIL
- **Após às 22:00 horas: JEJUM ABSOLUTO DE COMIDA**

**NO DIA DO EXAME:**

- **06:00 horas: Café da Manhã: Chá adoçado, sucos de cor clara (Coado) e Gelatina (Menos a de cor Vermelha).**
- **07:00 horas da manhã:** Misturar 100g de MANITOL em 1 litro de água ou suco de cor clara (Coado) e ingerir 1 copo a cada 10 minutos
- **Ingerir líquidos à vontade até às 09:00 Horas da manhã - Exemplos: Água, Suco, Chá, Isotônico.**
- **ATENÇÃO**

**PACIENTE DIABÉTICO**

<b>DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA</b>
-----------------------------------

<b>PREPARO DE EXAME</b>
-------------------------

**Medicamentos Orais (Comprimido):**

- Suspender o uso no dia do exame.

**Insulina:**

- Tomar 1/3 da dose no dia anterior ao exame; e
- Tomar 1/2 da dose no dia do exame.

**SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS**

O paciente deverá consultar o médico responsável pelo seu tratamento e solicitar a autorização por escrito da suspensão dos medicamentos referenciados abaixo.

**Pacientes que utilizam medicações como:**

**Antiagregantes Plaquetários:** PLAVIX, REAPRO, TICLID, AGRASTAT, ISCOVER ou AASS. (Suspender o medicamento 7 dias antes do procedimento).

**Anticoagulantes:** MAREVAN, MARCOMAR ou COUMADIN. (Suspender o medicamento 3 dias antes do procedimento).

**Anticoagulantes Injetáveis:** HEPARINA, CLEXANE ou FRAXIPARINA. (Suspender 3 dias antes do procedimento).

Os medicamentos para Hipertensão Arterial Sistêmica (Pressão Alta) **deverão** ser tomados normalmente.

**OBSERVAÇÕES:**

- Após o exame, o paciente poderá ingerir líquidos ou sólidos conforme aceitação após passar o efeito sedação;
- No dia do exame o paciente não irá trabalhar, dirigir ou realizar qualquer atividade que requeira atenção;
- É comum após o exame o paciente apresentar: amnésia (não se recordar do exame e das próximas horas após o exame), sonolência, diminuição dos reflexos, em consequência dos sedativos;
- É obrigatório que o paciente seja levado ao local do exame por um acompanhante adulto, maior de idade, que o acompanhará e o levará de volta até a sua casa, onde não poderá dirigir nem realizar tarefas que exija atenção, durante todo o dia; e
- **PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE ACOMPANHANTE MAIOR DE IDADE**

**Avise caso não possa comparecer ao exame, para que outro paciente possa ser atendido. Se o seu atendimento foi agendado pela Unidade Básica de Saúde, procure a mesma para cancelar e reagendar. Se foi feito pelo próprio AME, ligue (17) 3622-5470**